

Antitox cseppek

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

Homeopátiás gyógyszerkészítmény

Növényi-, állati- és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült alkoholos cseppek.
Belsőleg.

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a PHÖNIX Antitox?

Összetétel: 100 ml oldat tartalma:

10 ml 437,5 mg Bolus alba-ból Acidum sulfuricum D2-vel készült vizes desztillátum, 6 ml Antimonium crudum D8, 7 ml Arnica e floribus D2, 5 ml Arsenicum album D4, 3 ml Aspidium filix mas ex herbis D4, 4 ml Aurum chloratum D5, 6 ml 10,2 mg Camphora-ból készült vizes oldat, 2 ml, 50 mg Corallium rubrum-ból és 25 mg Kalium nitricum-ból készült etanoltartalmú desztillátum, 11 ml Cuprum sulfuricum D4, 4 ml Digitalis D4, 7 ml Helleborus viridis ex herbis D4, 6 ml Mercurius sublimatus corrosivus D6, 3 ml Hypericum ex herbis Ø = D1, 3 ml Juniperus communis Ø = D1, 6 ml Kalium nitricum D3, 2 ml Orthosiphon e foliis Ø = D1, 2 ml Urtica ex herbis D2, 3 ml Solidago Virga aurea ex herbis Ø = D1, 3 ml Spiraea ulmaria ex herbis Ø = D1, 2 ml Spongia Ø = D1, 3 ml 16,65 mg Tartarus depuratus-ból készült etanoltartalmú desztillátum, 2 ml Zincum metallicum D8.

Segédanyagok: etanol, tisztított víz

Etanoltartalom: 26 v/v %

Milyen betegség esetén ajánlott az alkalmazása?

A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése elsősorban bőrbetegségek esetén, a kiválasztó szervek működésének támogatásával a szervezet salaktalanítása.

Hogyan fejti ki hatását a PHÖNIX Antitox cseppek?


A homeopátiás gyógyszerek a szervezet öngyógyító törekvésének serkentésére hatnak. A PHÖNIX Antitox cseppek kombinációs homeopátiás készítmény, amelyben a monokomponensű szerek együttes jelenléte szélesebb indikációs területet tesz lehetővé az egyedi komponensek monoterápiás alkalmazásához képest. Így módon a terápia egyszerűbbé és megbízhatóbbá válik.

Mikor nem lehet a készítményt alkalmazni?

A gyógyszer 26 v/v % etanolt tartalmaz, ezért nem alkalmazható alkoholelvonó kezeléssel (Antaethyl, azaz diszulfiram) egyidejűleg.

Szedhet-e más gyógyszert a PHÖNIX Antitox cseppekkel?

Gyógyszerkölcsonhatások ezideig nem ismeretesek, azonban etanoltartalma miatt más gyógyszerek hatását befolyásolhatja.



Milyen más szerek befolyásolhatják a PHÖNIX Antitox cseppek hatását?

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidőben (\pm 1/2 óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Adható-e a PHÖNIX Antitox cseppek gyermekeknek?

Etanoltartalma miatt 12 éves kor alatti gyermekek kezelésére vonatkozóan, konzultáljon homeopátiás gyermekorvossal.

Terhesség és szoptatás alatt alkalmazható-e?

Nem állnak rendelkezésre adatok a PHÖNIX Antitox cseppek terhesség és szoptatás alatti kockázatairól, ennek ellenére terhesség és szoptatás ideje alatt csak orvosi javallatra alkalmazható.

Hogyan és milyen adagban kell a készítményt alkalmazni?

Az adagolást a beteg állapota szerint egyénileg kell beállítani.

Ha az orvos másképpen nem rendel, szokásos adagja naponta 4-szer 20 csepp.

Az alkalmazás módja

A cseppeket étkezés előtt 1/2 órával, kevés vízbe cseppentve kell bevenni.

A gyógyszer szedésének ideje alatt naponta minimum 1,5-2 l folyadék bevitelle szükséges.

Mire kell figyelni a készítmény szedésekor?

Etanoltartalma *egészségkárosító kockázat*ot jelenthet májbetegség, alkoholizmus, epilepszia, agysérülés és más központi idegrendszeri betegségek, valamint terhesség és gyermekek esetén.

Az alkalmazás kezdetén jellemző módon sor kerülhet a panaszok átmeneti erősödésére. Hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel.

A gyógyszer fémmel (pl. fémkiskanállal) nem érintkezhet.

A PHÖNIX Antitox cseppek növényi-, állati és ásványi eredetű természetes anyagokat tartalmaznak, így az egyes üvegek tartalmának íze és illata különbözhet és az oldat esetleg enyhén opálosodhat. Mindez nem befolyásolja a készítmény minőségét és hatékonyságát.

Használat előtt felrázandó!

Milyen nemkívánt mellékhatást válthat ki a PHÖNIX Antitox cseppek?

Hosszabb ideig tartó indokolatlan szedése esetén nemkívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel. Ezekről a panaszokról, ill. minden nemvárt tünetről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A készítmény szedése a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket nem befolyásolja.

Mennyi ideig szedhetők a PHÖNIX Antitox cseppek?

A javasolt adagolásban a panaszok megszűnéséig szedhető.

Mik a túladagolás jelei?

A PHÖNIX Antitox cseppekkel kapcsolatban ezidáig túladagolást nem jelentettek.

Hogyan kell tárolni a PHÖNIX Antitox cseppeket?

Szobahőmérsékleten (15-25 °C), fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve tárolandó. Tárolása során ügyelni kell arra, hogy fémtárgyakkal ne kerüljön kölcsönhatásba. A folyadék esetleges homályossá válása nem befolyásolja a készítmény hatásosságát.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Lejárat: 5 év.

Felbontás után a csomagoláson feltüntetett lejárati ideig használható.

Gyártó és forgalombahozatali engedély jogosultja:

Phönix Laboratórium GmbH, 71149 Bondorf, Benzstrasse 10, Németország

Forgalombahozatali engedély száma

OGYI-HG-022/01 (50 ml)

OGYI-HG-022/02 (100 ml)

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 23647/75/2002



V200711