

# Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe

Homöopathisches Arzneimittel

Bitte lesen Sie die gesamte **Gebrauchsinformation sorgfältig durch**, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden. Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Was ist Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe?

Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe eines therapeutischen Anwendungsgebietes.

## Was müssen Sie vor der Anwendung von Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe beachten?

Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Jod oder gegen einen der weiteren Bestandteile von Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe sind. Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe darf bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden. Bestandteile der Salbengrundlage wie Cetylstearylalkohol, Wollwachsalkohole und Butylhydroxytoluol können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen, Butylhydroxytoluol auch Reizungen der Augen und der Schleimhäute.

## Gebrauchsinformation Information für den Anwender

**Außer Vertrieb**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung von Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten angewendet werden.

Wenden Sie Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten an, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

## Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## Wie ist Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe anzuwenden?

Wenden Sie Spongia-Silicea Phcp<sup>®</sup> Salbe immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an.

## Soweit nicht anders verordnet:

Die Salbe 1 - 2 mal täglich auf die betroffenen Stellen auftragen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten angewendet werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bezüglich der Anwendung nicht ganz sicher sind.

Sollten während der Anwendung des Arzneimittels die Krankheitssymptome fortauern, müssen Sie medizinischen Rat einholen.

#### Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Spongia-Silicea Phcp® Salbe Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Anwender auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

**Sehr häufig:** mehr als 1 Behandler von 10

**Häufig:** 1 bis 10 Behandelte von 100

**Gelegentlich:** 1 bis 10 Behandelte von 1 000

**Selten:** 1 bis 10 Behandelte von 10 000

**Sehr selten:** weniger als 1 Behandler von 10 000

**Nicht bekannt:** Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

In seltenen Fällen können bei Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage (z.B. Cetylstearylalkohol, Wollwachsalkohole) allergische Hautreaktionen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### Wie ist Spongia-Silicea Phcp® Salbe aufzubewahren?

Arzneimittel müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach "Verwendbar

bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

#### Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25° C aufbewahren.

#### Weitere Informationen:

#### Zusammensetzung

10 g Salbe enthalten:

Acidum silicicum Trit. D3 0,1 g,

Calcium fluoratum Trit. D3 0,1 g,

Euspongia officinalis Dil. D2 0,1 g,

Ferrum phosphoricum Trit. D3 0,1 g,

Magnesium phosphoricum Trit. D3 0,1 g.

#### Darreichungsform und Inhalt

Spongia-Silicea Phcp® Salbe ist in Packungen mit 30 g und 100 g Salbe erhältlich.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 2517575.00.00

#### Pharmazeutischer Unternehmer

Phönix Laboratorium GmbH

Benzstraße 10

71149 Bondorf

www.phoenix-lab.de

Stand der Information: Februar 2016