

### .....

# Solidago II/035 B cseppek

**Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.**

- *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

Homeopátiás gyógyszerkészítmény

Növényi és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült alkoholos cseppek.

Belsőleg.

**Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek?**

**Összetétel:** 100 ml oldat tartalma:

11 ml 481,25 mg Bolus alba-ból Acidum sulfuricum D2-vel készült vizes desztillátum, 7 ml Antimonium crudum D8, 6 ml Arnica e floribus D2, 7 ml Aurum chloratum D5, 8 ml 13,6 mg Camphora-ból készült vizes oldat, 11 ml Cuprum sulfuricum D4, 6 ml Digitalis D4, 6 ml Helleborus viridis ex herbis D4, 6 ml Mercurius sublimatus corrosivus D6, 9 ml Juniperus communis Ø = D1, 10 ml Solidago virga aurea ex herbis Ø = D1, 7 ml Spiraea ulmaria ex herbis Ø = D1, 6 ml Urtica ex herbis D2.

*Segédanyagok:* etanol, tisztított víz

Etanoltartalom: 24 v/v %

**Milyen betegség esetén ajánlott az alkalmazása?**

A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése, a vesék kiválasztó funkcióinak támogatása.

**Hogyan fejt ki hatását a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek?**

A homeopátiás gyógyszerek a szervezet öngyógyító törekvésének serkentésére hatnak. A PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek kombinációs homeopátiás készítmény, amelyben a monokomponensű szerek együttes jelenléte szélesebb indikációs területet tesz lehetővé az egyedi komponensek monoterápiás alkalmazásához képest. Ily módon a terápia egyszerűbbé és megbízhatóbbá válik.

**Mikor nem lehet a készítményt alkalmazni?**


A gyógyszer 24 v/v % etanolt tartalmaz, ezért nem alkalmazható alkoholelvonó kezeléssel (Antaethyl, azaz diszulfiram) egyidejűleg.

**Szedhet-e más gyógyszert a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppekkel?**

Gyógyszerkölcsönhatások ezideig nem ismeretesek, azonban alkoholtartalma miatt más gyógyszerek hatását befolyásolhatja.

**Milyen más szerek befolyásolhatják a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek hatását?**

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidőben ( $\pm$  1/2 óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.



## **Adható-e a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek gyermekeknek?**

Etanoltartalma miatt 12 éves kor alatti gyermekek kezelésére vonatkozóan konzultáljon homeopátiás gyermekorvossal.

## **Terhesség és szoptatás alatt alkalmazható-e?**

Nem állnak rendelkezésre adatok a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek terhesség és szoptatás alatti kockázatairól, ennek ellenére terhesség és szoptatás ideje alatt csak orvosi javallatra alkalmazható.

## **Hogyan és milyen adagban kell a készítményt alkalmazni?**

Az adagolást a beteg állapota szerint egyénileg kell beállítani.

Ha az orvos másképpen nem rendel, szokásos adagja naponta 4-szer 20 csepp.

## **Az alkalmazás módja**

A cseppeket étkezés előtt ½ órával, kevés vízbe cseppentve kell bevenni.

A gyógyszer szedésének ideje alatt naponta minimum 1,5-2 l folyadék bevitelle szükséges.

## **Mire kell figyelni a készítmény szedésekor?**

Etanoltartalma *egészségkárosító kockázatot* jelenthet májbetegség, alkoholizmus, epilepszia, agysérülés és más központi idegrendszeri betegségek, valamint terhesség és gyermekek esetén.

Az alkalmazás kezdetén jellemző módon sor kerülhet a panaszok átmeneti erősödésére. Hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel.

A tünetekről tájékoztassa kezelőorvosát.

A gyógyszer fémmel (pl. fémkiskanállal) nem érintkezhet.

A PHÖNIX Solidago cseppek növényi és ásványi eredetű természetes anyagokat tartalmaznak, így az egyes üvegek tartalmának íze és illata különbözhet és az oldat esetleg enyhén opálosodhat. Mindez nem befolyásolja a készítmény minőségét és hatékonyságát.

Használat előtt felrázandó!

## **Milyen nemkívánt mellékhatást válthat ki a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek?**

Hosszabb ideig tartó indokolatlan szedése esetén nemkívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel. Ezekről a panaszokról, ill. minden nemvárt tünetről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

## **A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre**

A készítmény szedése a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket nem befolyásolja.

## **Mennyi ideig szedhetők a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppek?**

A javasolt adagolásban a panaszok megszűnéséig szedhető.

## **Mik a túladagolás jelei?**

A PHÖNIX Solidago II/035 B cseppekkel kapcsolatban ezidáig túladagolást nem jelentettek.

## **Hogyan kell tárolni a PHÖNIX Solidago II/035 B cseppeket?**

Szobahőmérsékleten (15-25 °C) fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve. Tárolása során ügyelni kell arra, hogy fémtárgyakkal ne kerüljön kölcsönhatásba. A folyadék esetleges homályossá válása nem befolyásolja a készítmény hatásosságát.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

## **Lejárat: 5 év.**

Felbontás után a feltüntetett lejárati ideig használható.

## **Gyártó és forgalombahozatali engedély jogosultja:**

Phönix Laboratórium GmbH, 71149 Bondorf, Benzstrasse 10, Németország

## **Forgalombahozatali engedély száma**

OGYI-HG-024/01 (50 ml)

OGYI-HG-024/02 (100 ml)

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 23651/75/2002

